

1a) Neutrale Wundspüllösung

Neutrale Wundspüllösung. Achtung - nach Anbruch innerhalb von 24h aufbrauchen oder verwerfen

	1	NaCl 0,9 %	500 ml
	1	Ringerlösung Glus	500 ml

1b) Wundspüllösung mit keimreduzierenden Eigenschaften

Milde Wundspüllösung mit 0,1% Polihexanid, zur wiederholten Anwendung an Wunden. Optimale Keimreduktion ab 15-20min Einwirkzeit. Sehr gut verträglich auch an chronischen Wunden. Gut kompatibel mit Wundfüllern. Inkompatibel mit Knorpel.

	1	Prontosan W	350 ml
--	---	-------------	--------

Zur Reinigung, Spülung, Befeuchtung und Dekontamination von akuten mechanischen und postoperativen Wunden, chronische Wunden, Verbrennungen I & II Grades, von Eintrittspforten urologischer Katheter, PEG-Sonden und Drainagen.

		1 Actimaris Sensitiv Lsg	300 ml
--	--	--------------------------	--------

2. Wundfüller

2a) Alginat

bei stark exsudierenden, oberflächlichen oder tiefen, auch bei infizierten Wunden geeignet - zusätzl. Effekt zur Blutstillung durch Calcium Freisetzung

	10	Suprasorb A-Pro Kompresse	5 x 5 cm
	10	Suprasorb A-Pro Kompresse	10 x 10 cm
	5	Suprasorb A-Pro Tamponade	2 x 45 cm

2b) Hydrofaser: Wundfüller und Wundrandschutz

stark absorbierende Wundauflage mit gebildenden Fasern für Wunden mit mittleren bis hohen Exsudatmengen, steril

	10	Durafiber	5 x 5
	10	Durafiber	10 x 10

2c) Hydrogel: Wundfüller antimikrobiell

Polihexanidgel 0,1% für kritisch kolonisierte und infizierte Wunden, Ablösen von Fibrin; nach Anbruch 8 Wochen haltbar

	1	Prontosan W Gel	30 ml
--	---	-----------------	-------

2d) Hydrobalance Wund"kompressen", antimikrobiell

Biosynthetische Faser mit 0,3 % Polihexanid, antibakteriell. Gut geeignet bei oberflächlichen, zu trockenen Wunden zum mehrtägigen Rückfeuchten.

Gelartige Faser auf Wunde und Umgebung legen (Umgebung vorher mit ZCR-ZincCream schützen) und dann mit Folie fixieren. Tragezeit 2-3 Tage.

Patientenname:

2f) Silberhaltige Wundtherapeutika - bei Wundinfektionen

Die Indikation für Silberprodukte ist die infizierte oder kritisch kolonisierte Wunde - zweckmäßig nur, wenn der Verband mehrtägig auf der Wunde verbleibt - ansonsten viel zu teuer; Achtung auf Silberallergie

	5	Suprasorb X + PHMB*	5 x 5 cm
	5	Suprasorb X + PHMB*	9 x 9 cm

2e) Kollagen

Fördert Granulation/Epithelisierung, hohe Saugkapazität, reinigender Effekt; Rinderkollagen; wird resorbiert

	5	Suprasorb C	4 x 6
--	---	-------------	-------

4. Kompressionstherapie - bis auf wenige Ausnahmen immer indiziert

4a) Unterpolsterungsvlies

Synthetische "Polsterwatte" - Erhöht den Komfort und mindert Druckstellen unter Kompressionsverbänden

	50	Rolta Soft	6 cm
	30	Rolta Soft	10 cm

Rasch und intensiv freisetzende Silberauflage mit nanokristallinem Silber. Immer vor Gebrauch mit Aqua bidestillata benetzen. die antimikrobielle Barriere bleibt bis zu 3 Tage wirksam; Kurzzeitanwendung

	5	Acticoat Flex 3*	10 x 10
	12	Acticoat Flex 3*	10 x 20

stark absorbierende Wundauflage mit gelbildenden Fasern für Wunden mit mittleren bis hohen Exsudatmengen, antimikrobiell, steril

	10	Durafiber AG*	10 x 10
	5	Durafiber AG*	15 x 15

2g) Traditionelle Wundfüller/Wundabdeckung - Typ Fettgaze

Grobmaschige Fettgaze

	10	Jelonet Gazeverband Tupfer steril	10 x 10
	10	Lomatüll (grobmaschig)	10 x 10

3. Wundabdeckung

3a) Hydrokolloidverband

Suprasorb H ist ein rasch selbsthaftender, flexibler, dichter, dünner Hydrokolloidverband. Wunde vor Anwendung gut von Nekrosen reinigen, kann nur wenig Exsudat aufnehmen

	10	Suprasorb H dünn	10 x 10
--	----	------------------	---------

3b) Schaumstoffwundauflage

Je nach Exsudat kann Allevyn bis zu 7 Tage auf der Wunde bleiben; Wechsel, wenn die Saugkapazität erschöpft ist.

	10	Allevyn Gentle Border	7,5 x 7,5
	10	Allevyn Gentle Border	12,5 x 12,5
	10	Allevyn Non-Adhesive	10 x 10

Für den Sakralbereich

	6	Allevyn Gentle Border sacrum	16,8 x 17,1
--	---	------------------------------	-------------

Dünne, silikonhaftende Wundauflage aus Polyurethanschäum für Wunden mit schwacher bis mäßiger Exsudation - steril.

	10	Allevyn Gentle Border lite	7,5 x 7,5
--	----	----------------------------	-----------

PU-Schaumverband für leicht bis mittel exsudierende Wunden und in allen Phasen der Wundheilung. Zverlässiges Exsudatmanagement

mit hohem Tragekomfort.

	5	Suprasorb P n.k.	15 x 15
--	---	------------------	---------

3c) Hydrokapillarverband

Absorbierender, mehrschichtiger Wundverband mit Folienabschluss, kann bis zu 7 Tage auf der Wunde verbleiben. Stark mittel und wenig exsudierender Decubitus und Ul. Cruris mit gesunder Umgebungshaut.

	10	Biatain	10 x 10
	10	Biatain	15 x 15

Patientenname:

4b) Kompressionsbandagen

Kurzzugbandagen. Ein unverzichtbarer Bestandteil einer Kompressionstherapie. Pat soll viel gehen und liegen - wenig stehen und sitzen!

Bei venösen Ulcera obligat und Mischulcera nach Klinik

	1	Rosidal Kurzzugbinde	8 x 5 m
	1	Rosidal Kurzzugbinde	10 x 5 m

Feine Langzugbinde mit geringer Rückstellkraft. Geeignet für milde Kompression beim Liegen oder bei der Oberschenkelkompression.

	1	Perfekta Fein Langzugbinde	10 x 7
	1	Perfekta Fein Langzugbinde	10 x 5
	1	Perfekta Fein Langzugbinde	8 x 5 m

5. Kompressionstherapie - Kompressionsmaterial - KP

5a) Mullkompressen

	100	Gazin 8-fach gelegt unsteril	7,5 x 7,5
	100	Gazin 8-fach gelegt steril (50x2 Stk.)	10 x 10

5b) Vliesstoffkomresse

Vliesstoffkomresse. Saugstark, anschmiegsam, Resorptionskraft 1

	100	Vliwasoft 6-fach steril	10 x 10
--	-----	-------------------------	---------

5c) Absorberkompressen

Absorbierende Wundauflage mit Vlies als zusätzliche Saugschicht im Inneren. Resorptionskraft Stufe 2.

	60	Vliwazell steril	10 x 10
	30	Vliwazell steril	10 x 20
	1	Stepcel Wundauflage gerollt	15 x 25 m

5d) Superabsorberkompressen

Superabsorbierende Wundauflage mit Polyacrylaten als zusätzliche Supersaugschicht im Inneren.

	1	TG - Schlauchverband	2
	1	TG - Schlauchverband	5
	1	TG - Schlauchverband	7
	1	TG - Schlauchverband	9
	10	Vliwasorb	10 x 20

	10	Vliwasorb	20 x 20
	25	Cutimed Sorbion sachet S	20 x 10
	25	Cutimed Sorbion sachet S	10 x 10

5e) Gazebinde - elastisch

Nicht kohäsive elastische Mullbinde zum Fixieren von Verbandstoffen - ist KEINE Kompressionsbinde!

	20	Raucolast	8 cm x 4 m
--	----	-----------	------------

Kohesive Binde zum Fixieren von Verbänden (ohne Zug/Druck anzuwenden) von Kompressionsbandagen (mit mittlerem Zug).

	1	Mollelast haft	10 x 20 m
	1	Mollelast haft	8 x 20 m

Patientenname:

6. Wundrandschutz

Reizfreier Hautschutz als Applikator (Lolly)

	5	Secura	1 ml
	5	Secura	3 ml

7. Folienfixierverband, Pflaster, Pflasterverband

7a) Folienverband zum Fixieren von Verbandstoffen mit Wasserschutz

	1	Suprasorb F	10 cm x 10 m
--	---	-------------	--------------

7b) Vliespflaster

Sehr gut verträgliches und gut haftendes Vliespflaster mit Acrylatklebefläche, für normale bis leicht empfindliche Haut.

	1	Micropore	2,5 x 9
--	---	-----------	---------

7c) Seidenacetatpflaster

Teuer

	1	Leukosilk	1,25 x 5 m
	1	Leukosilk	2,5 x 5 m

7d) Vliespflaster - Verband

Leicht elastischer Pflasterverband mit sehr hoher Haftkraft. Verletzungsgefahr beim Ablösen auf atropher, sensibler Haut

	1	Hypafix	10 cm x 10 m
	1	Hypafix	15 cm x 10 m

8. Geruchsmindernder, palliativer Verbandstoff

Aktivkohlegewirk imprägniert mit elementarem Silber (wird nicht in die Wunde abgegeben). Teurer, v.a. palliativer, antibakterieller und gut geruchsmindernder Wundverband (z.B. bei exulzierenden Hautmetastasen).

	10	Actisorb Silver 220*	10,5 x 10,5
--	----	----------------------	-------------

*) nur bei infizierten Wunden